

Présence de symptômes		
	<p>“Держится ли у тебя кашель более трех недель? “</p> <p>= « <i>Est-ce que tu tousses ? Depuis plus de trois semaines ?</i> »</p>	
	<p>“Бывает ли у тебя кашель с кровью?”</p> <p>= « <i>Quand tu tousses, y a-t-il parfois du sang dans tes crachats ?</i> »</p>	
	<p>“Поднимается ли у тебя температура без особой на то причины? “</p> <p>= « <i>As-tu de la fièvre sans que tu ne saches pourquoi ?</i> »</p>	
	<p>“Случается ли у тебя ночью обильное потоотделение? “</p> <p>= « <i>Transpires-tu beaucoup la nuit ?</i> »</p>	
	<p>“Замечаешь ли ты отсутствие аппетита и беспричинную потерю веса? “</p> <p>= « <i>As-tu perdu du poids et n’as-tu plus envie de manger ?</i> »</p>	
	<p>“Чувствуешь ли ты продолжительную усталость или упадок сил?”</p> <p>= « <i>Te sens-tu fatigué ou sans énergie depuis assez longtemps ?</i> »</p>	
	<p>“Чувствуешь ли ты боль в грудной клетке при дыхании или кашле?”</p> <p>= « <i>As-tu mal dans la poitrine lorsque tu respires ou tu tousses ?</i> »</p>	
Présence de facteurs de risque?		
Immuno-dépression suite à une maladie, un traitement etc	<p>“Страдаешь ли ты заболеванием или принимаешь ли ты лекарства, которые делают тебя более восприимчивым (ой) к микробам? ”</p> <p>= « <i>Souffres-tu d’une maladie ou prends-tu un médicament qui te rend plus fragile aux microbes ?</i> »</p>	
Antécédents de tuberculose	<p>“Болел (а) ли ты раньше туберкулезом? “</p> <p>= « <i>As-tu déjà eu la tuberculose ?</i> »</p>	
<b>Suspicion → référer pour examen clinique et/ou RX thorax</b>		