

Présence de symptômes		
	<p>“Öksürüyorsunuz ? üç haftadan fazla ?”</p> <p>=« Est-ce que tu tousses ? Depuis plus de trois semaines ? »</p>	
	<p>« Öksürdüğünde bazen tükürüğünde kan var mıdır ? »</p> <p>= « Quand tu tousses, y a-t-il parfois du sang dans tes crachats ? »</p>	
	<p>« Nedenini bilmeden ateşleniyormusun ? »</p> <p>= « As-tu de la fièvre sans que tu ne saches pourquoi ? »</p>	
	<p>« Gece çok terliyorsunuz ? »</p> <p>= « Transpires-tu beaucoup la nuit ? »</p>	
	<p>« Kilo kaybın varmı ? İştahsız mısın ? »</p> <p>= « As-tu perdu du poids et n’as-tu plus envie de manger ? »</p>	
	<p>« Kendini uzun süredir yorgun ve halsiz hissediyormusun ? »</p> <p>= « Te sens-tu fatigué ou sans énergie depuis assez longtemps ? »</p>	
	<p>« Nefes aldığında veya öksürdüğünde göğüsün ağrıyormu ? »</p> <p>=« As-tu mal dans la poitrine lorsque tu respires ou tu tousses ? »</p>	
Présence de facteurs de risque?		
Immuno-dépression suite à une maladie, un traitement etc	<p>« Mikroplara karşı güçsüz herhangi bir hastalığınız varmı veya ilaç kullanıyorsunuz ? »</p> <p>= « Souffres-tu d’une maladie ou prends-tu un médicament qui te rend plus fragile aux microbes ? »</p>	
Antécédents de tuberculose	<p>« Hiç tüberküloz oldunmu ? »</p> <p>= « As-tu déjà eu la tuberculose ? »</p>	
Suspicion → référer pour examen clinique et/ou RX thorax		